



La gestion de la dermatose nodulaire contagieuse bovine fait appel à trois groupes de mesures de lutte : vaccination des bovins, dépeuplement des lots d'animaux infectés et mesures strictes de biosécurité. Aucune de ces mesures de lutte appliquée isolément n'est suffisamment efficace. La détection précoce des animaux malades est donc essentielle.

Pourquoi surveiller quotidiennement TOUS mes bovins ?

En l'absence de mesures de lutte :

- Un animal infecté peut en contaminer 16 autres,
- Le risque de contamination d'un lot d'animaux situé dans un rayon de 4,5 km autour d'un foyer est proche de 100%.

La période d'incubation étant variable selon les animaux, **les signes peuvent apparaître subitement** sur des animaux qui semblaient en apparente bonne santé la veille. Ainsi, chaque jour perdu dans la détection des animaux malades/infectés augmente le risque de contamination des vecteurs et donc de propagation de la maladie.

Tous les bovins, sans oublier les plus éloignés du bâtiment et les animaux non productifs, doivent faire l'objet de cette surveillance.

Surveillance quotidienne

Détection précoce

Quand appeler son vétérinaire ?

Que le cheptel (ou le lot d'animaux) soit vacciné ou pas, tous les signes de la maladie doivent être recherchés quotidiennement : hyperthermie, oreilles basses, animal en retrait, abattu, diminution de l'appétit, diminution de la production laitière, nodules cutanés, jetage nasal ou buccal, œdèmes, boiteries, avortement.

Signes cliniques

J'appelle mon vétérinaire sanitaire



En pratique, optimiser la surveillance hors bâtiment

- Visiter **tous les lots de bovins** quotidiennement
- Regrouper les bovins (prévoir un seau de concentré)
- Isoler et contenir les animaux suspects (prévoir licol et moyens de contention)
- Si possible prendre la température de ces derniers (prévoir un thermomètre)
- En cas de signes cliniques, appeler son vétérinaire sanitaire