



COMMENT

dépister

mes veaux

à la naissance



Grâce à la nouvelle boucle officielle « 2 en 1 », c'est **SIMPLE, RAPIDE** et **FIABLE**

1 **JE COMMANDE MES BOUCLES BVD** et **LA PINCE SPECIFIQUE** (si c'est ma première commande de boucles BVD) . *Tube de prélèvement avec capuchon, sachet et enveloppe pré-affranchie fournis.*

2 **JE PRELEVE** tous mes veaux sous 48 H : évite les virémies transitoires (veaux contaminés après la naissance) et les prises de sang de recontrôle.

3 **J'ENVOIE** rapidement le prélèvement au Laboratoire ; conservation au frigo possible. J'inscris la date de prélèvement sur l'enveloppe.



4 **JE RECOIS LE RESULTAT :**
Notification rapide des résultats positifs.

seule une lutte collective permettra en quelques années de se débarrasser du virus de la BVD. Le dépistage des IPI par boucle auriculaire à la naissance est le moyen le plus rapide et le plus économique pour lutter contre cette maladie au regard des pertes engendrées

ATTENTION : La pose de boucles BVD ne protège pas contre le virus. Elle ne doit pas remplacer la vaccination qui est nécessaire dans certains contextes (pâturages collectifs, voisinage à risque...)