


BILAN BVD


DONNEES STATISTIQUES EN ISERE

EVOLUTION DE LA PREVALENCE D'IPI DÉTECTÉS SUR CARTILAGE DU 01/07/2020 AU 31/12/2022




PREVALENCE : NB D'INDIVIDUS INFECTES / NB D'INDIVIDUS TOTAL

EVOLUTION DU POURCENTAGE DE CHEPTELS QUI DEPISTENT LA BVD EN ISERE DEPUIS 2019



EVOLUTION DE LA PROPORTION DE VEUX TESTES EN ISERE



LA BVD EN BREF

La BVD ou Diarrhée Virale Bovine est un virus qui touche essentiellement les bovins. Le pouvoir immunodépresseur du virus influence fortement la santé générale du troupeau :

- problèmes reproducteurs
- pathologies néonatales
- chutes de production

La maladie se transmet par contact direct «mufle à mufle» entre un animal sain et un animal excréteur du virus, mais peut également être transmis de la mère au fœtus. L'infection du troupeau peut passer inaperçue mais engendrer la naissance de veaux IPI dans les mois qui suivent. De plus, le matériel peut être source de contamination (bottes souillées, pinces, mouchettes, bétailières...). Le nettoyage et la désinfection permettent de prévenir ces contaminations.

A RETENIR

Au 13/01/2023, 71.4% des bovins présents dans les exploitations iséroises sont garantis non IPI.

En 2022, plus de 95% des veaux naissants en Isère ont été testés. Les 5% restants font référence aux veaux morts nés, aux problèmes rencontrés lors du dépistage (absence d'échantillon, perte, mauvaise conservation) et aux oublis.

En moyenne, sur 2022, la prévalence des veaux infectés par la BVD est de 0.19%. En 2019 elle était de 0.7% Cette donnée témoigne d'une nette diminution des cas suite au dépistage virologique systématique à la naissance. Actuellement, 96.4% des exploitations iséroises dépistent les veaux à la naissance contre seulement 80 % en 2020